



親愛的家長：

我向您致函以使您了解一種關於能預防您青少年得到腦膜炎球菌感染症的疫苗，此疾病為一種罕見、但是危險的細菌性感染，可造成腦膜炎和敗血症。此疫苗稱為結合型腦膜炎疫苗，這間辦事處以及疾病控制與預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 建議介於 11 至 18 歲的所有青少年都應接種此疫苗，在 11 至 12 歲接種最佳。

腦膜炎球菌感染症的病例數量每年都不同。1998 年至 2007 年，大約每年有 1,500 名美國人受到感染，且大約九人裡就有一人死亡。青少年和年輕成年人特別容易受到這種感染。實際上，所有腦膜炎球菌感染症的病例中將近 15% 發生在青少年和年輕成年人身上，並且造成其中七人就有一人死亡。

特定的生活習慣使得青少年和年輕成年人有得到此疾病的風險。這包括了團體生活情況（露營、宿舍）、不規律的睡眠週期、與感染者近距離接觸（感染者可能沒有顯示出症狀）。

早期的症狀容易被誤診為病毒感染，例如流行感冒，但是一旦感染後，腦膜炎球菌感染症將會快速的發展，並且在 48 小時內造成死亡。多達五分之一的生還者將會有永久性的殘疾，包括腦部受損、聽力受損、癲癇，以及手臂或腿部截肢。

若要瞭解更多關於腦膜炎球菌感染症的預防資訊，請

誠摯地，



全國傳染病基金會 (National Foundation for Infectious Diseases) 向您提供一項與知名醫療保健組織合作的公眾教育計劃。這項計劃的目標獲得了疾病控制與預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention) 的支持。欲瞭解更多資訊、支持組織的名單，以及更多的資料，請造訪 <http://stopmeningitis.nfidinitiatives.org>。