

Corte a lo largo de la línea

Recorte fuera de la línea

Doble aquí

Una iniciativa de educación pública presentada por la Fundación Nacional contra las Enfermedades Infecciosas (National Foundation for Infectious Diseases), en colaboración con las principales organizaciones de la salud. Los objetivos de este programa están financiados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention). Visite <http://stopmeningitis.org> para obtener más información, una lista de las organizaciones que brindan financiación y materiales de recursos adicionales.

Este programa es posible gracias a un subsidio educativo limitado otorgado por sanofi pasteur a la Fundación Nacional contra las Enfermedades Infecciosas (National Foundation for Infectious Diseases). 7/2010

www.nfid.org  
National Foundation for Infectious Diseases

Doble aquí

**DATOS SOBRE LA ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA**

- Muy a menudo, la enfermedad meningocócica causa meningitis y septicemia.
- Los adolescentes y los adultos jóvenes presentan un mayor riesgo de contraer la enfermedad meningocócica. Representan alrededor del 15% de los casos en los EE. UU., y aproximadamente uno de cada siete adolescentes infectados morirá.
- La enfermedad meningocócica es poco común, pero puede ser letal. La cantidad de casos de la enfermedad meningocócica cambia año tras año. De 1998 a 2007, alrededor de 1,500 estadounidenses se infectaron por año, y aproximadamente uno de cada nueve murió.
- El contacto cercano prolongado entre grupos grandes (por ejemplo, en campamentos de verano diurnos y nocturnos o residencias estudiantiles) puede exponer a los adolescentes y estudiantes a situaciones de alto riesgo para contraer la enfermedad meningocócica.
- Hasta uno de cada cinco sobrevivientes sufre discapacidades permanentes, incluidos pérdida de la audición, daño cerebral o amputaciones de miembros.
- La mayoría de los casos de enfermedad meningocócica en adolescentes y adultos jóvenes se puede prevenir mediante la vacunación.

**INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN**

Los funcionarios de salud pública recomiendan la vacunación de todos los adolescentes de 11 a 18 años, ya que es mayor su riesgo de contraer meningitis.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) publicaron las recomendaciones. 7/2010

Doble aquí

Recorte fuera de la línea

Corte a lo largo de la línea